

Vragenlijst voor patiënten om het risico op een tuberculose infectie (TBC) in te schatten.

Sommige patiënten kunnen zonder dit zelf te weten tuberculose hebben. Deze bacterie kan bijvoorbeeld in de longen zitten, zonder klachten te veroorzaken. Bij het starten van een bepaalde groep geneesmiddelen (biologicals) die TNF-remmers worden genoemd (infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab) kan de bacterie weer actief worden. Daarom moet voor het starten worden onderzocht of u TBC onder de leden heeft, door het maken van een longfoto (X-thorax). Bij verhoogd risico op TBC wordt ook nog aanvullend onderzoek verricht (bloedonderzoek en een Mantoux test). Verhoogd risico lopen o.a. personen geboren voor 1960, of geboren in een land waar TBC vaak voorkomt (bij meer dan 50 per 100.000 inwoners).

Wilt u svp onderstaande vragenlijst invullen en opsturen naar uw behandelend arts?

(per post, per email (poli.dermatologie@amsterdamumc.nl), of via een bericht in mijn dossier)

1. Bent u geboren in een land waar TBC vaak voorkomt, bij meer dan 50 per 100.000 inwoners (zie de lijst van landen op de volgende pagina)?

- Nee / Ja / Onbekend

2. Heeft u langer dan 3 maanden gereisd of gewoond in een land waar TBC vaak voorkomt, bij meer dan 50 per 100.000 inwoners (zie de lijst van landen op de volgende pagina)?

- Nee / Ja / Onbekend

3. Bent u geboren voor 1960?

- Nee / Ja / Onbekend

4. Heeft u ooit tuberculose (TBC) gehad, of een positieve Mantoux test of bloedonderzoek passend bij een infectie met de tuberculose bacterie?

- Nee / Ja / Onbekend

5. Heeft u ooit (bewezen) contact gehad met mensen met (open) tuberculose?

- Nee / Ja / Onbekend

6. Werkt u in de gezondheidszorg of heeft u in de gezondheidszorg gewerkt?

- Nee / Ja / Onbekend

7. Werkt u (direct of intensief) met risicogroepen voor tuberculose (immigranten, asielzoekers, mensen zonder verblijfsvergunning, dak- en thuislozen, alcohol- en drugsverslaafden, etc.) of heeft u in het verleden met deze risicogroep gewerkt?

- Nee / Ja / Onbekend

8. Behoort of behoorde u zelf tot een risicogroep voor tuberculose (dak- en thuislozen, alcohol- en drugsverslaafden, verblijf in buitenlandse gevangenis)?

- Nee / Ja / Onbekend

Alles nee: laag risico op tuberculose infectie, alleen een röntgenfoto maken is voldoende

Minstens 1 vraag ja/onbekend: verhoogd risico op sluimerende tuberculose infectie, aanvullend onderzoek doen (Mantoux test en bloedonderzoek). De Mantoux test houdt in dat er een prik in de arm wordt gegeven die na 3 dagen wordt afgelezen. Als er een bultje ontstaat is er contact geweest met de tuberculose bacterie.

Lijst van landen met tuberculose incidentie > 50/100.000 inwoners (2022)		
Afghanistan	Ghana	Niger
Algeria	Greenland	Nigeria
Angola	Guinea	Northern Mariana Islands
Azerbaijan	Guinea-Bissau	Pakistan
Bangladesh	Guyana	Palau
Benin	Haiti	Papua New Guinea
Bhutan	India	Peru
Bolivia (Plurinational State of)	Indonesia	Philippines
Botswana	Kazakhstan	Republic of Moldova
Brunei Darussalam	Kenya	Romania
Burundi	Kiribati	Rwanda
Cambodia	Kyrgyzstan	Sao Tome and Principe
Cameroon	Lao People's Democratic	Senegal
Central African Republic	Republic	Sierra Leone
Chad	Lesotho	Solomon Islands
China	Liberia	Somalia
Congo	Libya	South Africa
Cote d'Ivoire	Madagascar	South Sudan
Democratic People's Republic	Malawi	Sri Lanka
of Korea	Malaysia	Sudan
Democratic Republic of the	Mali	Tajikistan
Congo	Marshall Islands	Thailand
Djibouti	Mauritania	Timor-Leste
El Salvador	Micronesia (Federated States	Tokelau
Equatorial Guinea	of)	Tuvalu
Eritrea	Mongolia	Uganda
Eswatini	Morocco	Ukraine
Ethiopia	Mozambique	United Republic of Tanzania
Fiji	Myanmar	Uzbekistan
Gabon	Namibia	Viet Nam
Gambia	Nauru	Zambia
Georgia	Nepal	Zimbabwe